

学校法人お東学園  
お東幼稚園 提出用

※担任へご提出ください。

## 登園届

園児氏名 \_\_\_\_\_

住 所 \_\_\_\_\_

生年月日 平成 年 月 日

【病名】 \_\_\_\_\_ と診断され、

\_\_\_\_\_ 年 月 日、医療機関において、病状が回復し、

集団生活に支障がない状態と判断されましたので登園いたします。

\_\_\_\_\_ 年 月 日

保護者名 \_\_\_\_\_ ㊞



# 学校感染症の出席停止期間について

学校法人 お東学園 お東幼稚園

第1種	病名			停止となります。 完治するまで登園
	エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 天然痘（痘瘡） 南米出血熱 ペスト マールブルグ熱 ラッサ熱 急性灰白髄炎（ポリオ） ジフテリア 重症急性呼吸器症候群（SARS） 鳥インフルエンザ			
第2種	病名	感染しやすい期間	登園停止期間の目安	医師の診断を受け、感染症に関する登園届を提出してください。 子どもがかかりやすく流行する可能性の高い感染症です。
	インフルエンザ	発症24時間前から後3日間がもっとも多く通常7日以内。	発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日	
	百日咳	抗菌薬を服用していないときは咳が出始めてから3週間経つまで。	特有の咳が消失するまで。又は、5日間の適正な抗菌薬による治療が終了するまで。	
	はしか（麻疹）	発症1日前から、発しん出現後の4日くらい。	解熱後3日を経過するまで。	
	おたふく風邪（流行性耳下腺炎）	発症2日前から耳下腺腫脹後5日。	耳下腺、顎下腺、又は舌下腺の膨張が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。	
	風疹（三日はしか）	発しん出現の数日前から、出現後5日くらい。	発しんが消失するまで。	
	水ぼうそう（水痘）	発しん出現2日前から、発しんがかさぶたになるまで。	すべての発しんが消失するまで。	
	プール熱（咽頭結膜熱）	発熱・充血などの症状があらわれて数日間。	主要症状が消退した後、2日を経過するまで。	
結核/髄膜炎菌性髄膜炎		病状により園医、その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで。		
第3種	病名	潜伏期間	症状	集団生活で流行する恐れのある感染症が広く含まれ、医師から感染の恐れがないと許可ができるまで出席停止となります。
	コレラ	1～5日	症状が重いときは、1日20～30回の下痢が起こり、急速に脱水症状が進む。発熱はなく、むしろ低体温になる。	
	細菌性赤痢	1～5日	発熱、下痢、腹痛が起きる。便に血や膿が混ざる。	
	腸管出血性大腸菌感染症	3～4日	風邪のような症状から始まり、その後、激しい腹痛、水溶性の下痢、血便、おう吐、発熱。重症化すると、尿毒症や脳炎などを併発。	
	腸チフス	1～3週間	40℃前後の高熱が続き、赤い発しんが出る。多くは便秘し、腸出血や、せん孔などの合併症を起こすことも。	
	パラチフス	1～2週間	40℃前後の高熱が続き、赤い発しんが出る。	
	流行性角結膜炎	5～12日	まぶたのはれや異物感、痛み、充血、目やに。発熱や下痢を伴うこともある。	
	急性出血性結膜炎（アポロ熱）	5～12日	強い目の痛み。白目に充血して、真っ赤になる。痛みや異物感、涙目など。	
その他の感染症	溶連菌感染症、手足口病、りんご病（伝染性紅班）、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎、とびひ（伝染性膿痂しん・皮膚化膿症）、ウィルス性胃腸炎（ノロ・ロタ・アデノウィルス）、アタマジラミ、細菌性胃腸炎（食中毒）、水いぼ（伝染性軟属腫）、突発性発疹、ヘルペス性菌肉口内炎（単純ヘルペス感染症）、急性出血性結膜炎、はやり目（流行性角結膜炎）、など			